איך יודעים אם יש צורך בהתאמת הקסדה?

אנשי המקצוע של Talee הוכשרו להתאים ולכוונן את האביזרים לאורך הטיפול. לאחר הסרת הקסדה, האם אתם רואים כתמים אדומים על ראש התינוק שאינם נעלמים במהלך ההפסקה היומית בת השעה? אם לא, הקסדה מותאמת כראוי ומתאימה לשימוש.

איך מטפלים בעור התינוק?

המשיכו בשגרת הטיפול היומית בעור שהייתה נהוגה לפני השימוש בקסדה. המתינו לספיגת הקרמים לפני חבישתה. ודאו שהקסדה והראש יבשים לפני החבישה. במקרה של פריחת חום או דלקת עור ממגע, השתמשו בקרמים להרגעה ולייבוש העור. בדרך כלל איננו ממליצים על משחות המבוססות על וזלין. אם אינכם בטוחים, פנו לאיש המקצוע המטפל מטעם Talee.

איך מבדילים בין פצע לחץ לדלקת עור ממגע?

אם כתם אדום אינו נעלם במהלך ההפסקה היומית בת השעה, שקלו את הדברים הבאים:
תחילה טפלו באזור בקרם המקומי שבו אתם כבר משתמשים והניחו לו להתייבש. לאחר מכן הוסיפו חבישת כותנה דקה או חבישה משרוול כותנה ללא דבק, והחזירו את הקסדה.
המתינו 2–3 שעות.
בדקו אם חל שינוי בעור. אם מדובר בדלקת עור ממגע, פעולה זו תביא לשיפור עקבי בעור, וייתכן שעור ילדכם רגיש מאוד. אפשר לחזור על הגישה הזאת עם הפסקות תכופות יותר לטיפול בעור.
אם מדובר בפצע לחץ, האדמומיות אינה חולפת בעקבות שינוי החומר שבמגע עם העור. בשני המקרים, שקלו לפנות לאיש המקצוע המטפל מטעם Talee לקבלת הנחיות נוספות לפי הצורך.

מה עושים אם התינוק לא חבש את הקסדה במשך כמה ימים?

אם ילדכם לא חבש את הקסדה במשך כמה ימים, בדקו אם יש פצעי לחץ על ראשו. חבשו את הקסדה למשך כ־2–3 שעות ולאחר מכן עשו הפסקה והסירו אותה. טפלו בקסדה ובראש כרגיל והמתינו עד שסימני לחץ אפשריים ייעלמו. אם הם נעלמים בתוך שעה, החזירו את הקסדה, האריכו את משך החבישה ואז עשו הפסקה נוספת. חזרו על התהליך עד לחזרה ללוח החבישה של 23 שעות ביממה. התהליך עשוי להימשך עד 2–3 ימים. אם פצעי הלחץ אינם נעלמים בתוך שעה ואינכם מצליחים לחזור ללוח החבישה, פנו לאורתוטיסט בהקדם האפשרי.

מתי אפשר לראות שיפור?

בדרך כלל נראה שיפור מסוים כבר לאחר שבועיים בלבד של חבישה. גדילת הגולגולת מהירה ביותר בתחילת הטיפול, והקסדה מכוונת גדילה זו. המשיכו בעבודה הטובה!

Invent Medical USA LLC. כל הזכויות שמורות.
Talee Getting Started; rev. 2025-03-31-EN_USA

www.taleetop.com



מתחילים את הדרך

ליישום האינטרנט (Android)

להורדת האפליקציה לאייפון

למדריך למטפלים (PDF)

הוראות חבישה וטיפול

1 על ילדכם לחבוש את הקסדה 23 שעות ביממה. בשבוע הראשון פועלים לפי לוח הדרגתי להסתגלות. אל תמהרו, גם אם אין אי־נוחות. חבישה בהיקף מלא מתחילה ביום החמישי.

2 אין להשתמש בקסדה אם לילדכם יש חום מעל 38°C / 100.4°F. אם החום נמוך מכך, בדקו אותו באופן סדיר והסירו את הקסדה אם הוא עולה. חזרו לחבישה בהקדם האפשרי.

3 אפשר להסיר את הקסדה במהלך פיזיותרפיה. התייעצו עם הפיזיותרפיסט והחזירו אותה מיד לאחר הטיפול.

4 נקו וחטאו את הקסדה מדי יום. אפשר לחלק את ההפסקה בת השעה לשתי הפסקות היגיינה של 30 דקות. השתמשו רק בחומרי חיטוי על בסיס אלכוהול וללא בישום. במידת הצורך כוונו טיימר כדי לשמור על השגרה.

5 חפפו את ראש ילדכם מדי יום בשמפו. במידת הצורך השתמשו בשמפו היפואלרגני. אין להרטיב את הקסדה — הסירו אותה לרחצה והחזירו אותה לאחר הייבוש.

6 הזעה בתחילת השימוש היא תופעה רגילה. במידת הצורך הסירו את הקסדה לזמן קצר כדי לייבש את הראש ואת הקסדה במגבת או במייבש שיער באוויר קר. הימנעו מאבקות, מקרמים וממוצרים מבושמים. התאימו את הלבוש כדי למנוע הזעת יתר.

7 הימנעו מגילוח ראש ילדכם, משום שצמיחת השיער מחדש עלולה לגרום לגירוי. שמרו על אורך שיער קבוע לאורך הטיפול כדי להבטיח התאמה נאותה.

8 בדקו את העור לאחר הסרת הקסדה. אם האדמומיות נמשכת יותר משעה או אם העור פגוע, הסירו את הקסדה ופנו לאורתוטיסט.

9 אם הקסדה אינה בשימוש יותר מ־48 שעות, גדילת הגולגולת עלולה להקשות על חבישתה מחדש. הגבילו את הזמן ללא הקסדה ופנו לאורתוטיסט אם אינכם מצליחים לחבוש אותה.

10 בדקו תמיד את הרצועות ואת הפתחים כדי לוודא שהם סגורים ומאובטחים כראוי. חלקים רופפים עלולים להיות מסוכנים אם יישאפו או ייבלעו.

11 הרחיקו את הקסדה מחום, מאור שמש, מחיות מחמד ומילדים. אל תאפשרו לילדים לשחק בה.

12 הדריכו את המטפלים בילד כיצד להשתמש בקסדה, לנקות אותה ולהסיר אותה כראוי.

לוח החבישה

לוח חבישה של 23 שעות חיוני להשגת תוצאות מוצלחות.

הקסדה נחבשת 23 שעות ביממה כדי למנוע המשך גדילה לא תקינה של הגולגולת. חבישה של פחות מ־23 שעות ביממה עלולה למנוע תוצאות מיטביות ואף לגרום לבעיות בצורת הגולגולת. יש לחבוש את הקסדה 23 שעות ביממה גם לקראת סוף הטיפול.

יום	משך חבישה	משך הפסקה	חבישה בשינה / תנומה	הערה
1	שעה	שעה	לא	חזרו על המחזור לאורך היום
2	שעתיים	שעה	לא	חזרו על המחזור לאורך היום
3	4 שעות	שעה	לא	חזרו על המחזור לאורך היום
4	8 שעות	שעה	כן	חזרו על המחזור לאורך היום
5	23 שעות	שעה	כן	התחילו את לוח החבישה המלא

אזהרות

אזהרה: על איש המקצוע והמטפל בתינוק לבדוק את עורו במרווחים תכופים (למשל, כל 3–4 שעות) כדי לזהות גירוי או פגיעה בעור.

אירוע או תופעת לוואי: אביזר זה עלול לגרום לגירוי או לפגיעה בעור. הפסקת הטיפול בניגוד להנחיה רפואית עלולה להביא לתיקון קטן יותר בצורת הראש. הארכת הטיפול בניגוד להנחיה רפואית עלולה להגביל את גדילת הראש ולפגוע בגדילת המוח ובהתפתחותו.
אי־עמידה בלוח החבישה המומלץ עלולה לגרום לקשיים משמעותיים בהתאמת הקסדה. יש להתייעץ עם איש המקצוע המטפל לגבי כל הפסקה בטיפול.

אזהרה: בדקו בקפידה את שלמות המבנה של האביזר ואת התאמתו, כדי לצמצם את הסיכון שהאביזר יחליק ממקומו או שחלקים ממנו ישתחררו ויגרמו לחנק או לפגיעה בעיני התינוק או בעורו.

אזהרה: לעולם אל תנסו לשנות את הקסדה לעיצוב הגולגולת בבית. אם נדרשות התאמות, פנו מיד לאיש המקצוע המטפל.